

PAPRYKA POŁOWA

PREPARATY:

POLYVERSUM WP

VAPOR GARD

BLACK JAK

BIOCAL

PROTECTOR

DELTA NHCa



ZALECENIA

Rozsada:

Siew - produkcja pikówki

BLACKJAK – 250ml na rozsadę przeznaczoną na 1ha

Podlać bezpośrednio po siewie nasion (wielodoniczki, tace wysiewne, itp.)

Uwaga :

Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek lub tac wysiewnych.

Po przepikowaniu do dużych doniczek
Polyversum WP - stężenie - 0.05 % (50g na 100 litrów wody)

+

BLACKJAK – 250ml na rozsadę przeznaczoną na 1ha

PAPRYKA POŁOWA

2 – 3 dni przed wysadzeniem

Polyversum WP - stężenie - 0.05 % (50g na 100 litrów wody)

- Podlać – ilość przeznaczona na 1 ha rozsady.

3-24H przed wysadzeniem

BLACKJAK – 250 ml

Podlać rozsadę (30-40 tys. sztuk rozsady)

Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. rozmiary wielodoniczek i wielkości roślin.

Uwaga!

Preparatu BlackJak nie wolno stosować w fazie liścieni!

Przy stosowaniu Polyversum nie stosować żadnego innego fungicydu doglebowego!

Przed wysadzeniem

VAPOR GARD - stężenie - 1 % (100ml na 10 litrów wody)

- opryskiwanie – wydajność na 30-40 tys. szt rozsady.

UWAGA:

Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym zabiegiem

Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła dziennego

W polu

14 – 16 dni po wysadzeniu

BLACKJAK – 2L/ha

Zabieg wykonać przy użyciu 400-500L wody na ha.

PAPRYKA POŁOWA

(stymulacja wytwarzania strefy włóśnikowej korzeni)

**Stymulacja wzrostu roślin i owoców –
produkty uzupełniające program stosować przemiennie:**

Faza widocznego wzrostu owoców pierwszego i drugiego piętra

TERRA SORB COMPLEX - 1 – 1.5 l/ha – zabieg można powtórzyć po 14 dniach

DELTA NHCa – 5l/ha – zabieg powtórzyć nie częściej jak co 14 dni

Zapobieganie suchej zgniliznie wierzchołkowej

Faza orzecha włoskiego pierwszych owoców
BIOCAL - 1 l/ha + PROTECTOR - 300 ml/ha

Kolejne zabiegi wykonać co 14 dni (około 2-3 zabiegi)
BIOCAL - 1 l/ha + PROTECTOR - 300 ml/ha

Zapobieganie szarej pleśni i zgniliznie twardzikowej

PAPRYKA POŁOWA

Owoce o wielkości 5 – 6 cm

Polyversum WP - 100 g/ha + PROTECTOR - 400 ml/ha

2 - 3 zabiegi co 14 dni

UWAGA:

Zachować odpowiedni odstęp w zależności od stosowanych fungicydów chemicznych w przypadku stosowania Polyversum.

Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy

Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu

NIE STOSOWAĆ ZE ZWILŻACZAMI !!!

ZALECA SIĘ STOSOWANIE ŁACZNE PREPARATÓW BIOCAL I POLYVERSUM.

Problemy ze wzrostem roślin

W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem w okresie wegetacji

TERRA SORB COMPLEX - 1–1.5 l/ha + BLACKJAK 1-2 l/ha

Wykonać 2 – 3 zabiegi w sezonie co ok. 14 dni

Dawki dostosować do wielkości i fazy rozwojowej roślin.

Przedłużenie jakości pozbiorczej – obrót handlowy

bezpośrednio przed zbiorem

POLYVERSUM WP - 100 g/ha + PROTECTOR - 400 ml/ha

(ochrona przed porażeniem szara pleśnią)

Dodatek PROTECTORA do wykonywanych zabiegów poprawia działanie agrochemikaliów (środki ochrony roślin, nawozy dolistne):

PAPRYKA POŁOWA

1. Chroni kroplę przed zbyt szybkim wyschnięciem.
2. Zwiększa ilość substancji aktywnej pozostającej na roślinie po zabiegu.
3. Przedłuża okres działania agrochemikaliów poprzez zabezpieczenie przed negatywnym wpływem promieni UV oraz wysokiej temperatury.
4. Zapobiega również ich zmywaniu w czasie występujących opadów deszczu lub deszczowania.
5. PROTECTOR wzmacnia również naturalną woskową ochronę tkanek roślinnych redukując zagrożenie ze strony patogenów.

Do wszystkich pozostałych zabiegów agrochemicznych zaleca się dodawać BlackJak w dawce 50 ml/100L wody w celu obniżenia pH wody i pobudzenia metabolizmu roślin.

BlackJak dodać na początku napełniania opryskiwacza!