

KAPUSTA PEKIŃSKA

PREPARATY:

POLYVERSUM WP

BIOCAL

BLACK JAK

VAPOR GARD

PROTECTOR

TERRA SORB COMPLEX

ZALECENIA

Siew w wielodoniczkach:

BLACKJAK – 250 ml na rozsadę przewidziana na 1 ha.

Podlać bezpośrednio po siewie nasion.

Uwaga! Preparatu BlackJak nie stosować w fazie liścieni!

Rozsada:

W fazie początków liścia właściwego

POLYVERSUM WP – stężenie 0,05% (50 g – 100litrów wody)

Opryskiwać.

UWAGA:

Przy stosowaniu Polyversum nie stosować żadnego innego fungicydu doglebowego.

2-3 dni przed wysadzeniem

BIOCAL – stężenie - 0,35% (350ml – 100litrów wody)

Opryskać rozsadę!

3-24H przed wysadzeniem

BLACKJAK – 250 ml

Podlać rozsadę (30-40 tyś. sztuk rozsady)

Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek.

Przed wysadzeniem jako ostatni zabieg ochronny

VAPOR GARD - stężenie 1 % (100ml – 10litrów wody)

Opryskiwać! Wydajność – 10 litrów wody na 30-40tys. sztuk rozsady!

UWAGA:

1. Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym zabiegiem.
2. Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła dziennego.

W polu

**ZAPOBIEGANIE CHOROBYM FIZJOLOGICZNYM np. TIPBURN
ORAZ STYMULACJA WYTWARZANIA I WZROSTU STREFY WŁOŚNIKOWEJ
KORZENI**

14 – 16 dni po wysadzeniu

BLACKJAK – 2L/ha

Zabieg wykonać przy użyciu 400-500litrów wody na ha.

Tuż przed zamknięciem główek

BIOCAL – 1,25 - 1,5l/ha + PROTECTOR - 350ml/ha

14 dni po zamknięciu główek

BIOCAL - 1,25 - 1,5l/ha + PROTECTOR - 350ml/ha

Uwaga :

Utrzymywać optymalną wilgotność gleby w trakcie uprawy roślin.

Dodatek PROTECTORA do wykonywanych zabiegów poprawia działanie agrochemikaliów (środki ochrony roślin, nawozy dolistne):

1. Chroni kroplę przed zbyt szybkim wyschnięciem.
2. Zwiększa ilość substancji aktywnej pozostającej na roślinie po zabiegu.
3. Przedłuża okres działania agrochemikaliów poprzez zabezpieczenie przed negatywnym wpływem promieni UV oraz wysokiej temperatury.
4. Zapobiega również ich zmywaniu w czasie występujących opadów deszczu lub deszczowania.
5. PROTECTOR wzmacnia również naturalną woskową ochronę tkanek roślinnych redukując zagrożenie ze strony patogenów.

PROBLEMY ZE WZROSTEM ROŚLIN

W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem w okresie wegetacji

TERRA SORB COMPLEX - 1 – 1,5 l/ha + BLACKJAK - 1 - 2l/ha

Wykonać 2 – 3 zabiegi w sezonie co ok. 14 dni

Dawki dostosować do wielkości i fazy rozwojowej roślin.

PROBLEMY Z USZKODZENIEM SYSTEMU KORZENIOWEGO

(np. zalanie roślin , uszkodzenie systemu korzeniowego przez śmietkę itp.)

BLACKJAK - 2 l/ha

Zabieg wykonać przy użyciu 400-500 litrów wody na ha.

ZAPOBIEGANIE CHOROBYM PRZECHOWALNICZYM PRZED ZBIOREM

5 – 7 dni przed zbiorem

POLYVERSUM WP 100 – 150 g/ha + Protector 400 ml/ha

UWAGA:

Zachować odpowiedni odstęp od stosowanych wcześniej fungicydów chemicznych!

Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy.

Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu.

NIE STOSOWAĆ Z INNYMI ZWILŻACZAMI !!!

Do wszystkich zabiegów agrochemicznych należy dodawać BlackJak w dawce 50 ml/100L wody w celu obniżenia pH wody i pobudzenia metabolizmu roślin.

BlackJak dodać na początku napełniania opryskiwacza!