

OGÓREK POLOWY

PREPARATY:

POLYVERSUM WP

BI OCAL

BLACK JAK

VAPOR GARD

PROTECTOR

TERRA SORB COMPLEX

ZALECENIA

Rozsada:

Siew – wielodoniczki:

BLACKJAK – 250ml na rozsadę przeznaczoną na 1 ha

Podlać bezpośrednio po siewie nasion.

Uwaga :

**Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek -
multiplatów.**

OGÓREK POŁOWY

2 – 3 dni przed wysadzeniem

POLYVERSUM WP - stężenie - 0.05 % (50g na 100 litrów wody)

- Podlać – ilość przeznaczona na 1 ha rozsady.

3-24 h przed wysadzeniem

BLACKJAK – 250 ml na rozsadę przeznaczoną na 1 ha

Podlać rozsadę

Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek.

Uwaga!

Preparatu BlackJak nie wolno stosować w fazie liścieni!

Przy stosowaniu Polyversum nie stosować żadnego innego fungicydu doglebowego!

Przed wysadzeniem

VAPOR GARD - stężenie 1 %; (100 ml – 10 litrów wody)

Opryskiwać ! (10 L wody na 30-40 tys. sztuk rozsady!)

UWAGA:

1. Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym zabiegiem.

OGÓREK POLOWY

2. Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła dziennego.

W przypadku uprawy ogórka z siewu zabiegi rozpocząć od 3-4 liścia!

3 – 4 liście

POLYVERSUM WP - 100 g/ha + BLACKJAK - 2l/ha

Zabieg wykonać przy użyciu 400-500 L wody na ha.

(stymulacja wytwarzania strefy włósnikowej korzeni oraz zbudowanie odporności)

Przed kwitnieniem

POLYVERSUM WP - 100 g/ha + PROTECTOR - 300 ml/ha

Od początku kwitnienia

BIOCAL - 1 l/ha

2 – 3 zabiegi co 14 dni

(w celu poprawy jędrności i wyrównania owoców)

OGÓREK POLOWY

Po drugim zbiorze, kolejne zabiegi wykonać co 7 - 10 dni do końca wegetacji

POLYVERSUM 100 g/ha + PROTECTOR 300 ml/ha

UWAGA:

Zachować odpowiedni odstęp w zależności od stosowanych fungicydów chemicznych

Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy

Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu

NIE STOSOWAĆ ZE ZWILŻACZEM !!!

Dodatek PROTECTORA do wykonywanych zabiegów poprawia działanie agrochemikaliów (środki ochrony roślin, nawozy dolistne):

1. Chroni kroplę przed zbyt szybkim wyschnięciem.
2. Zwiększa ilość substancji aktywnej pozostającej na roślinie po zabiegu.
3. Przedłuża okres działania agrochemikaliów poprzez zabezpieczenie przed negatywnym wpływem promieni UV oraz wysokiej temperatury.
4. Zapobiega również ich zmywaniu w czasie występujących opadów deszczu lub deszczowania.
5. PROTECTOR wzmacnia również naturalną woskową ochronę tkanek roślinnych redukując zagrożenie ze strony patogenów.

Problemy ze wzrostem roślin

W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem w okresie wegetacji

TERRA SORB COMPLEX - 1-1.5 l/ha + BLACKJAK 1-2 l/ha

OGÓREK POŁOWY

Wykonać 2 – 3 zabiegi w sezonie co 7-10dni

Dawki dostosować do wielkości i fazy rozwojowej roślin.

Do wszystkich pozostałych zabiegów agrochemicznych zaleca się dodawać BlackJak w dawce 50 ml/100L wody w celu obniżenia pH wody i pobudzenia metabolizmu roślin.

BlackJak dodać na początku napełniania opryskiwacza!

W przypadku wystąpienia na plantacji dużej presji mączniaka rzekomego lub prawdziwego zastosować preparat chemiczny!