

INSTRUKCJA STOSOWANIA

UPRAWA	DAWKI I TERMINY (ilość wody dostosować do specyfiki uprawy i stadium rozwoju roślin)
Ziemniaki	Pierwszy zabieg wykonać, gdy rośliny osiągną 20–25 cm, kolejny zabieg powtórzyć po 2–3 tyg. Dawka: 2 l/ha
Zaprawianie sadzeniaków	Stosować od 100 do 200 ml/1 l wody na 100 kg sadzeniaka, można stosować łącznie z chemicznymi preparatami
Marchew, pietruszka	Pierwszy zabieg wykonać, gdy nasć osiągnie 10–15 cm, drugi zabieg powtórzyć po 2–3 tyg. Dawka: 1 l/ha
Warzywa z rozsady	Moczyć lub podlać rozsadę przed wysadzeniem używając 250 ml na rozsadę przewidzianą na powierzchnię 1 ha (zalecana ilość wody: ok. 100 litrów). Ok. 14 dni po wysadzeniu rozsady w pole stosować dawkę 2 l/ha /300–500 litrów wody. W przypadku stosowania przez system irygacyjny dawka 250 ml/100 litrów wody, zabieg można powtórzyć po ok. 14 dniach.
Sady	Nowe nasadzenia: moczyć korzenie drzewek przed wysadzeniem, stosując dawkę 250 ml/100 litrów wody. Po ruszeniu vegetacji stosować fertygację 300–500 ml/1000 l wody. Stosować dolistnie wraz z nawozami i środkami ochrony roślin w dawce 50 ml/100 litrów wody. W optymalnych temperaturach (>18°C) stosowany łącznie z giberelinami pozwala ograniczyć ich dawkę o 15-20%. W niższych temperaturach (14-18°C) poprawia transport i efektywność giberelin.
Truskawki	Nowe nasadzenia: moczyć sadzonki przed wysadzeniem, używając 250 ml/100 litrów wody. 2 tygodnie po wysadzeniu stosować dawkę 2 l/ha. W drugim lub trzecim roku uprawy: zabieg wykonać po ruszeniu vegetacji dawką 2 l/ha, powtórzyć po ok. 15 dniach.

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ

POZOSTAŁE ZALECENIA

Przyspieszanie wschodów.

Nasiona małe: podlać bezpośrednio po siewie używając 250 ml/100 litrów wody.

Nawadnianie kropelkowe (Fertygacja): bezpośrednio po wysadzeniu 300–500 ml/1000 litrów wody, zabieg powtarzać co 3–4 tygodnie.

Dodatek do nawozów dolistnych (lepsze wykorzystanie nawozów):
50 ml/100 litrów wody.

UWAGA: Nawożenie dolistne nie zastępuje standardowego programu nawożenia doglebowego.

Buforowanie cieczy opryskowej w celu obniżenia pH: 50 ml/100 litrów wody.

Nie stosować z jakimkolwiek zwilżaczem.

Szczegółowych informacji należy szukać na www.bioagris.pl.

MIESZANIE

BLACKJAK można mieszać z większością znanych nawozów dolistnych i agrochemikaliów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, dokładnie zamknięte w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności. W razie wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody.

PRZESTRZEGAĆ ZASAD TRANSPORTU I PRZECHEWYWANIA:

Chronić przed nasłonecznieniem. Przechowywać w temp. -5°–35°C. Okres przydatności do stosowania – 3 lata. Ilość warstw w czasie transportu/składowania – 5 warstw.

Produkt wprowadzany do obrotu zgodnie z Art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu

Dystrybutor:
Bioagris Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Lubawska 4A; 03-011 Warszawa
info@bioagris.pl, tel.: +48 793 797 757

Producent:
Sipcam Inagra,
Carretera Mareny Blau,
46410 Sueca (Va), Hiszpania

BLACKJAK®

Blackjak jest skoncentrowaną zawiesiną Leonardytu. Poprawia rozwój systemu korzeniowego.



BLACKJAK jest skoncentrowaną wodną zawiesiną Leonardytu. Dzięki unikalnej metodzie wytwarzania zachowuje wszystkie zawarte w nim składniki, przede wszystkim huminy oraz kwasy ulmowe.

BLACKJAK:

- poprawia wzrost i rozwój korzeni, w szczególności korzeni włóśnikowych,
- poprawia wyrównanie kiełkowania nasion oraz wschody,
- ułatwia pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych korzeni,
- przyspiesza wzrost i rozprzestrzenianie się korzystnych mikroorganizmów glebowych w strefie wokół korzeni,
- ogranicza negatywne skutki zasolenia oraz zanieczyszczenia gleby agrochemikaliami,
- dodawany do nawozów dolistnych poprawia ich przyswajalność.

BLACKJAK może być stosowany w uprawach wszystkich roślin warzywniczych, sadowniczych oraz rolniczych.

Skład:

pH: 3,5–5

- Leonardyt: min. 28%
- Zawartość substancji organicznej: min. 20%
- Huminy, kwasy ulmowe, kwasy humusowe, kwasy fulwowe

Zawartość netto: **1L**

BLACKJAK®

BAR CODE GOES HERE